



คาถา “ 5 ย.”
ป้องกันสุนัขกัด

ย1  **อย่าเหยย** สุนัขให้โมโห

ย2  **อย่าเหยียบ** หาง หิ้ว คอ ขา หรือทำให้สุนัขตกใจ

ย3  **อย่าแยก** สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า

ย4  **อย่าหยีบ** จานข้าว หรือ เคลือบถ้วยอาหารขณะสุนัขกำลังกิน

ย5  **อย่ายุ่ง** หรือเข้าไปใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่ใช่เจ้าของ

เมื่อถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน ควรทำอย่างไร

ล้างแผล
ด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง ให้สะอาดถึงขั้นแผล ล้างสบู่ ออกให้หมด เช็ดให้แห้ง และ ใส่ยารักษาแผลสด




รู้ไว้...ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า



กักสัตว์
จดจำสัตว์ที่กัดไว้ และสืบหา เจ้าของ เพื่อกักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน พร้อมสอบสวนประวัติการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า



ไปหาหมอ
ไปหาหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับการป้องกันที่ถูกต้อง หากสัตว์มีอาการสงสัย โรคพิษสุนัขบ้าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์



ถูกสัตว์กัด/ข่วน ต้องล้างแผล ใส่ยา กักสัตว์ หากหมอฉีดวัคซีนต้องให้ครบชุด

“ถูกกัด - ข่วน อ่าหนึ่งนอนใจ ต้อวไปหาหมอ มิฉะนั้นอาจตาขได้”



นำสุนัขไปเลี้ยงบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สำหรับหมาแมว อายุ 3 - 4 เดือน แลต่อไปทุกปี

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์



อ๊กน้องหมา
อย่าลืมพาน้องไป **ฉีดวัคซีน** ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นะจ๊ะ



ความรู้ที่มักเข้าใจผิด



✘ สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข มักไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

✔ สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข หากไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็เป็นบ้าได้



✘ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น

✔ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้ทุกฤดู



✘ โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว รักษาให้หายได้

✔ โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว "รักษาไม่หาย ตายทุกราย"

อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรค ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจ นานเกิน 1 ปี อาหารเริ่มแฉกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัดแล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กล้ามเนื้อสั่นไหว ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลืนน้ำ ปวดท้องน้อยและ ขากสั่นเมื่อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด

อาการที่พบในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคหลังจาก ถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง 3-8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และจะตาย ภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการ ซึ่งมีทั้งแบบคุร้าย และแบบซึม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ



ระยะเริ่มแรก

> นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง หงุดหงิด เก็บตัว หวาดระแวง



ระยะตื่นเต้น

> กระวนกระวาย กัดไม่เลือก ทำหอน



ระยะอัมพาต

> น้ำลายไหล คางห้อยตก ล้มลง ตาย



คำแนะนำ สำหรับคนเลี้ยงสุนัข

01

นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี (ปีแรกควรรีด 2 ครั้ง)



02

ไม่ปล่อยสุนัขไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่นำสุนัข ออกนอกบ้าน ต้องอยู่ในสายจูง



03

ไม่นำสุนัขไปปล่อย และต้องคุมก้นกัด ไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป



หยุดปล่อยสุนัข

หยุดปัญหาสุนัขจรจัด