

ไข้อยู่แล้ว ออก

“เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะ”

อาการ



ไข้สูง
เฉียบพลัน



หน้าแดง
มีผื่น



คลื่นไส้
อาเจียน
เมื่ออาหาร



อ่อนเพลีย
ปวดกล้ามเนื้อ



เลือดกำเดาไหล



เลือดออก
ตามไรฟัน



อาเจียน
เป็นเลือด



ถ่าย
เป็นเลือด



4 กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง จากไข้เลือดออก



เด็กที่มีอายุ
ต่ำกว่า 5 ปี



ผู้สูงอายุ



ผู้ที่มี
โรคประจำตัว



ผู้ที่มี
ภาวะอ้วน



กลุ่มเสี่ยง

- ผู้ที่เป็นโรคอ้วน
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว
- ผู้ใหญ่เสี่ยงตายกว่าเด็ก 2-3 เท่า

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิต คือไปพบแพทย์หรือรักษาช้า



ปัจจุบันไม่มียารักษาเฉพาะ เป็นการรักษาตามอาการ



ชะล่าใจ... อาจได้ตาย

เพราะ ไข้เลือดออก



อาการ

อาการทั่วไป

ไข้สูงลอย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เบื่ออาหาร มีจุดแดงเล็กๆ ขึ้นตามลำตัว

อาการรุนแรง

มีเลือดออก เช่น มีเลือดกำเดา เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระสีดำ หากไข้ลดลงร่วมกับมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น อาจช็อกและเสียชีวิต ให้รีบไปพบแพทย์ทันที



หากมีไข้สูงลอยเกิน 2 วัน เช็ดตัวหรือกินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด ให้รีบไปพบแพทย์ ไม่ควรซื้อยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน ยาชุด ไดโครฟีแนก แอสไพริน มากินเอง